

Олимпиада абитуриентов естественно-научных факультетов СПбГУ, 1991 год, вариант 2

1. а) Решите уравнение $\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x} \cos x = -1$.
 б) Найдите множество всех точек плоскости, являющихся серединами отрезков, концы которых лежат на кривой $y = x^3$.
 в) Найдите все такие a , при которых функция $y = \lg(x + \sqrt{a^2 + x^2})$ нечетная.
 г) Найдите все такие b , что при любом a уравнение $ax + b = |x|$ имеет решение.

2. Пусть $f(x) = \sqrt{x+1} - x$.
 а) Решите неравенство $f(x) > -1$.
 б) Найдите множество значений функции f .
 в) Найдите число положительных решений уравнения $|f(x)| = a$.

3. Дан равнобедренный треугольник с углом α при вершине.
 а) Докажите, что

$$\frac{r}{R} = \sin \alpha \operatorname{tg} \frac{\pi - \alpha}{4},$$

где r и R — радиусы вписанной и описанной окружностей соответственно.

- б) При каком α отношение $\frac{r}{R}$ принимает наибольшее значение?
 в) Докажите, что в общем случае отношение $\frac{r}{R}$ принимает наибольшее значение для равносторонних треугольников.

4. а) Пусть $a \leq b$, $x \leq y$. Докажите, что $(a+b)(x+y) \leq 2(ax+by)$.
 б) Докажите неравенство Чебышева: если

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n, \quad b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n, \quad \text{то} \quad \sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

- в) Пусть функция f монотонно возрастает на $[0; 1]$. Докажите, что $\int_0^1 f(x) dx \leq 2 \int_0^1 x f(x) dx$.

